

Pohlavní systém mužský

A Little Known Fact



The first testicular guard was used in cricket in 1874




and the first helmet was used in 1974.



It took 100 years for men to realize that the brain is also important.


Organa genitalia masculina interna


- testis (*orchis*) = varle
- epididymis = nadvarle
- funiculus spermaticus
semenný provazec
 - včetně ductus deferens (= chámovodu)
- glandula vesiculosa / seminalis (vesiculae seminales) = semenné vāčky
- prostata = předstojná žláza
- glandula bulbourethralis = bulvotrubicová žláza



Organa genitalia masculina externa


- penis = pyj
- urethra masculina = mužská močová trubice
- scrotum = šourek





Organa genitalia masculina interna

- testis (*orchis*) = varle
- epididymis = nadvarle
- funiculus spermaticus
semenný provazec
 - včetně ductus deferens (= chámovodu)
- glandula vesiculosa / seminalis (vesiculae seminales) = semenné vâčky
- prostata = předstojná žláza
- glandula bulbourethralis = bulvotrubicová žláza



Orchis



Orchis italica



Orchis italica – naked-man orchid



Orchis militaris




Varle = Testis

- vnější popis
 - extremitas superior + inferior
 - facies medialis + lateralis
 - margo anterior + posterior
- obaly a vrstvy
 - tunica vaginalis
 - lamina parietalis
 - cavitas vaginalis testis
 - lamina visceralis
 - tunica albuginea

- vazy
 - lig. scrotale (zbytek po gubernaculum testis)
 - lig. epididymidis superius + inferius
- teplota: o 2°C nižší

100. Varle a nadvarle – testis et epididymis

- 1 Varle
Testis
- 2 Horní pól
Extremitas anterior
- 3 Přední okraj
Margo anterior
- 4 Zadní okraj
Margo posterior
- 5 Zevní plocha
Facies lateralis
- 6 Dolní pól
Extremitas inferior
- 7 Nadvarle
Epididymis
- 8 Hlava nadvarlete
Caput epididymidis
- 9 Tělo nadvarlete
Corpus epididymidis
- 10 Ocas nadvarlete
Cauda epididymidis
- 11 Chámovod
Ductus deferens
- 12 Šourkový vaz
Lig. scrotale (gubernaculum testis)




Varle = Testis

- vnější popis
 - extremitas superior + inferior
 - facies medialis + lateralis
 - margo anterior + posterior
- obaly a vrstvy
 - tunica vaginalis
 - lamina parietalis
 - cavitas vaginalis testis
 - lamina visceralis
 - tunica albuginea

- vazy
 - lig. scrotale (zbytek po gubernaculum testis)
 - lig. epididymidis superius + inferius
- teplota: o 2°C nižší

100. Varle a nadvarle – testis et epididymis

- 1 Varle
Testis
- 2 Horní pól
Extremitas superior
- 3 Přední okraj
Margo anterior
- 4 Zadní okraj
Margo posterior
- 5 Zevní plocha
Facies lateralis
- 6 Dolní pól
Extremitas inferior
- 7 Nadvarle
Epididymis
- 8 Hlava nadvarlete
Caput epididymidis
- 9 Tělo nadvarlete
Corpus epididymidis
- 10 Ocas nadvarlete
Cauda epididymidis
- 11 Chámovod
Ductus deferens
- 12 Šourkový vaz
Lig. scrotale (gubernaculum testis)




Varle = Testis

- vnější popis
 - extremitas superior + inferior
 - facies medialis + lateralis
 - margo anterior + posterior
- obaly a vrstvy
 - tunica vaginalis
 - lamina parietalis
 - cavitas vaginalis testis
 - lamina visceralis
 - tunica albuginea

- vazy
 - lig. scrotale (zbytek po gubernaculum testis)
 - lig. epididymidis superius + inferius
- teplota: o 2°C nižší

100. Varle a nadvarle – testis et epididymis

- 1 Varle
Testis
- 2 Horní pól
Extremitas superior
- 3 Přední okraj
Margo anterior
- 4 Zadní okraj
Margo posterior
- 5 Zevní plocha
Facies lateralis
- 6 Dolní pól
Extremitas inferior
- 7 Nadvarle
Epididymis
- 8 Hlava nadvarlete
Caput epididymidis
- 9 Tělo nadvarlete
Corpus epididymidis
- 10 Ocas nadvarlete
Cauda epididymidis
- 11 Chámovod
Ductus deferens
- 12 Šourkový vaz
Lig. scrotale (gubernaculum testis)




Varle = Testis

- vnější popis
 - extremitas superior + inferior
 - facies medialis + lateralis
 - margo anterior + posterior
- obaly a vrstvy
 - tunica vaginalis
 - lamina parietalis
 - cavitas vaginalis testis
 - lamina visceralis
 - tunica albuginea

- vazy
 - lig. scrotale (zbytek po gubernaculum testis)
 - lig. epididymidis superius + inferius
- teplota: o 2°C nižší

100. Varle a nadvarle – testis et epididymis

- 1 Varle
Testis
- 2 Horní pól
Extremitas superior
- 3 Přední okraj
Margo anterior
- 4 Zadní okraj
Margo posterior
- 5 Zevní plocha
Facies lateralis
- 6 Dolní pól
Extremitas inferior
- 7 Nadvarle
Epididymis
- 8 Hlava nadvarlete
Caput epididymidis
- 9 Tělo nadvarlete
Corpus epididymidis
- 10 Ocas nadvarlete
Cauda epididymidis
- 11 Chámovod
Ductus deferens
- 12 Šourkový vaz
Lig. scrotale (gubernaculum testis)



obaly a vrstvy (varle je retroperitoneální)

tunica vaginalis (sestupující dvojlist peritonea – řídké kolagenní vazivo s elastickými vlákny, mesotel)


lamina parietalis - periorchium

cavitas vaginalis testis – cavum serosum scroti

lamina visceralis - epiorchium


tunica albuginea

- husté kolagenní
vazivo





Varle – *vnitřní stavba*

- tunica albuginea → septula
 - tunica vasculosa
 - parenchyma testis → lobuli testis (200-300)
 - mediastinum testis
 - tubuli seminiferi contorti (30-70 cm)
 - **zárodečný epitel (složitý víceřadý)**
- tubuli recti testis → rete testis Halleri → ductus efferentes testis (již v hlavě nadvarlete)



Copyright © 2009 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.





Ductus deferens

Head of the
epididymis

Ductuli efferentes

Varle - testis

Body of the epididymis

Mediastinum testis

Rete testis

Seminiferous tubule


Septum

Tunica albuginea

Tunica vaginalis


Tail of the
epididymis


Tubuli recti



Semenotvorné kanálky

- průsvit 150 - 250 μm
 - **Zárodečný (spermiogenní, semenný) epitel (složitý víceřadý)**
 - 80 μm vysoký
 - Zárodečné (spermiogenní) buňky
 - **Sertoliho** buňky (spojovací komplexy)
- bazální membrána
- LPM:
 - stratum myoideum
 - myoidní (peritubulární kontraktilní) buňky (myofibroblasty)
 - stratum fibrosum






A histological section of the testis, stained with hematoxylin and eosin (H&E). The image shows several seminiferous tubules on the left, which are cross-sections of the testis containing developing sperm cells. The tubules are separated by interstitial tissue. On the right, a thick, dense, pink-stained layer represents the tunica albuginea, the fibrous covering of the testis. The overall structure is organized into a regular, repeating pattern of tubules and interstitium.

tunica albuginea


Tubuli seminiferi contorti



Zárodečný epitel

Epithelium spermatogenicum


- Vývoj spermií
- zárodečné buňky (*cellulae spermatogenicae*)
 - jednotlivá stadia vývoje spermií = **spermatogenesis**
 - Spermatocytogeneze
(spermatogonie $2n \rightarrow$ primární a sekundární spermatocyty $\rightarrow$ spermatidy n)
 - Spermatohistogeneze
(spermiogeneze)
 - (spermatidy $\rightarrow$ spermie)




Zárodečný epitel


Epithelium spermatogenicum

- zárodečné buňky (*cellulae spermatogenicae*)
 - jednotlivá stadia vývoje spermií = **spermatogenesis**
 - 4-8 řad jader
 - **spermatogonie (A a B)**
 - u stěny kanálku, dělí se *mitoticky*
 - B pronikají do adluminálního kompartmentu
 - **primární spermatocyty**
 - dělí se v 1. *meiotickém* dělení
 - **sekundární spermatocyty**
 - dělí se 2. *meiotickém* dělení
 - **spermatidy (spermatidia)**
 - zrají a uvolňují se do nitra kanálků, odplaveny
 - šroubovitě uspořádány
 - **64 dní = spermatogenesis**





Spermatocytogeneze






Spermatohistogeneze






Spermatogeneze


spermatocytogeneze




spermatohistogeneze



Spermatocytogeneze





Spermatocytogeneze

- **Spermatogonie** malé, kulaté, velké sférické jádro, hodně ribosomů) – v pubertě výhradně

dceřinné buňky

- **Spermatogonie typu A s tmavými jádry** (zůstávají)
- **Spermatogonie typu A se světlými jádry** (množí se, můstky)

Spermatogonie typu B (tmavší jádra)

- Dělí se, zvětšují

Spermatocyty I. řádu (primární spermatocyty)


- Sférické; vstup do luminálního oddílu, meióza I. (profáze trvá 22 dní)



Spermatocyty II. řádu (sekundární spermatocyty) – n


- Malé sférické bb (10 – 12 μm)., sférické jádro bez jadérka, hodně ribosomů; vstup do meiózy II. (bez S fáze)

Spermatidy (7-8 μm)

- Vysoce kondenzovaný chromatin; zahájení spermatohistogeneze







Intercellular
Bridges

Spermatohistogeneze

- **Spermatidy** (zanořené v membráně Sertoliho bb)
změny

Spermatohistogeneze

- **Spermatidy** (zanořené v membráně Sertoliho bb)

změny tvaru a charakteru jádra (elongace jádra, nahrazení histonů protaminy → kondenzace, toroidy; mikrotubuly u dist. pólu – manžeta)


změny v oblasti Golgiho komplexu (PAS pozit. proakrosomální granula → akrosomální granulum v akrosom. váčku → přesun před jádro → akrosom)

- hyaluronidáza, neuraminidáza, kys. fosfatáza, akrosin
- distálně od akrosomu nukleární prstenec (glykoproteiny)

změny v uspořádání mitochondrií hromadění mitochondrií kolem začátku axonematu; ubiquitinace membrán)


odstranění přebytečné cytoplazmy reziduální – balanční tělísko)

vývoj bičíku



Histones degradation

New components



Flagellum

Manchette

Centriole

Golgi

Acrosomal vesicle

Acrosome

Manchette

Fibrous sheath

Annulus

Mitochondrial sheath

Vývoj bičíku

- **Centrioly** (migrace k opačnému pólu buňky než akrosom)
 - **distální centriol** (orientován podélně, → bazální tělísko, zahajuje tvorbu axonematu; invaginace membrány kolem vznikajícího bičíku s vrstvou glykoproteinů - anulus)
 - **proximální centriol** (orientován kolmo; kolem provazce ED proteinové substance s příčným pruhováním– základ segmentovaných chord)




po ukončení elongace buňky




- Mizí mikrotubulární manžeta
- Oddělují se balanční tělíska



Spermiogenesis





- kanálky nadvarlete
- spermatidy
 - kondenzovaný chromatin, $\uparrow$ mitochondrií
 - Golgiho fáze
 - akrozomální fáze
 - maturační fáze
- od spermatogonie ke spermii: **$64 \pm 4,5$ dne**
- cyklus semenotvorného epitelu: **16 ± 1 den**
 - doba, za kterou se v určitém místě epitelu znovu objeví určité vývojové stadium















Spermie - spermatozoon







- Axonema (vazby dyneinových ramének)
- Hladké chordy
- Fibrózní pochva









Zrání spermie

- bezprostředně po ejakulaci nejsou schopné oplodnění (*fertilisatio*)
- **kapacitace – 7 hodin**
 - z povrchu akrozomu odstraněn obal
- akrozomální reakce
 - hyaluronidáza + akrozin umožní průchod spermii skrz corona radiata et zona pellucida vajíčka
- **životnost 48 hodin**
- **životnost vajíčka jen 24 hodin**

Sertoliho buňky

Sustenocyti (Epithelocyti sustentantes)


- obalují zrající spermatogenní buňky
- tvar podlouhlé pyramidy, jádro bazálně
- **hemato-testikulární bariéra** (*claustrum haematotesticulare*)
 - **zonulae occludentes** mezi buňkami
 - ochrana před cizorodými látkami
 - imunobiologické prostředí
- **compartimentum adluminale** (oddíl luminální)
 - specifické prostředí
- **apparatus junctionalis sustentocyticus**
 - tvořen zonulae occludentes mezi oběma kompartmenty
- **compartimentum basale** (oddíl bazální)
 - určen krevním prostředím

Sertoliho buňky

Sustenocyti (Epithelocyti sustenantes)


- **výživa a opora**
- **fagocytóza** reziduální tělíska vzniklá při zrání spermií)
- **testikulární tekutina**
- **androgen-binding protein** (ABP) váže testosteron a zvyšuje jeho nabídku v nitru kanálku
- **anti-mülleriánský hormon** (AMH) = Müllerian inhibiting factor/ substance (MIF/MIS) vyvolává zánik ductus paramesonephricus Mülleri
- **inhibin** tlumí sekreci FSH
- krajně odolné proti všem nepříznivým vlivům včetně záření → nedělí se


Sertoliho buňky





luminální oddíl


basální oddíl












Charcotův-Böttcherův krystaloid




Intesticiální tkáň


Textus connectivus intertubularis


- **Leydigovy buňky** 15 – 20 um, polyedrické, eosinofilní; sférické velké jádro, velké SER, tubulární mitochondrie; lipidové kapénky, Reinkeho krystaloidy
- **testosteron**
 - aktivní zejména mezi 8.-12. týdnem nitroděložního vývoje (vliv HCG)
 - zásadní význam pro diferenciaci pohlavních orgánů v mužský typ
 - opět aktivní od puberty (vliv LH)
 - vazba na ABP umožňuje jeho vysokou koncentraci v tubuli seminiferi → zdárný průběh spermiogeneze
 - sekundární pohlavní znaky
- Řídké kolagenní vazivo, fen. kapiláry, fibroblasty, žírné buňky, makrofágy





Leydigovy intersticiální buňky

















Germinal Epithelium


Leydig Cells


Crystal of Reinke




Reinkeho krystalloid










By Attributed to William Segar/ Attributed to George Gower/ Formerly attributed to Nicholas Hilliard
<http://www.artfund.org/what-to-see/exhibitions/2013/10/10/elizabeth-i-and-her-people>, Public Domain
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17871>



Medical Hypotheses

Volume 17, Issue 3, July 1985, Pages 277-284



Queen Elizabeth I: A case of testicular feminization?

R. Bakan

Show more ▾

+ Add to Mendeley Share Cite

[https://doi.org/10.1016/0306-9877\(85\)90134-3](https://doi.org/10.1016/0306-9877(85)90134-3)

Get rights and content ➤

Full text access

©1998, Encyclopædia Britannica, Inc.



By Attributed to William Segar/ Attributed to George Gower/ Formerly attributed to Nicholas Hilliard
<http://www.artfund.org/what-to-see/exhibitions/2013/10/10/elizabeth-i-and-her-people>, Public Domain
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17871>


Syndrom androgenové rezistence

AIS – androgen insensitivity syndrome




Syndrom androgenové rezistence

AIS – androgen insensitivity syndrome




Mužské vývodné cesty pohlavní

- intratestikulární
 - tubuli recti
 - rete testis
- Extratestikulární
 - ductuli efferentes
 - ductus epididymidis
 - ductus deferens
 - ductus ejaculatorius




Vývodní pohlavní cesty 1.

- **tubuli recti testis**
 - **jednovrstevný kubický** epitel
- **rete testis**
 - **jednovrstevný kubický** (plochý až cylindrický)
- **ductuli efferentes testis**
 - jedno- až **dvojřadý kubický až cylindrický** epitel (*vlnitý, vroubkovaný reliéf*)
 - cylindrické - řasinky
 - kubické - mikrokly
 - 12 - 20 kanálků (12 cm)




Vývodní pohlavní cesty 2.


- **ductus epididymidis**
 - dvojřadý cylindrický epitel
 - Malé bazální bb– kulaté
 - Cylindrické sahající k luminu – stereocilie
 - 4 - 6 m dlouhý mnohotně stočený
 - inhibice kapacity (glycerolfosfocholin)
- **ductus deferens**
 - dvojřadý až víceřadý cylindrický epitel
 - vlásky (*stereocilia*)
 - silná svalová stěna
- **ductus ejaculatorius**
 - chybí svalová vrstva



Nadvarle = Epididymis

- vnější popis
 - caput, corpus, cauda
- vnitřní popis
 - ductus epididymidis
 - lobuli epididymidis
- vazy
 - lig. epididymidis superius + inferius





S

Tubuli recti



S

SC


SC

R


Rete testis




Ductuli efferentes



500 μ m













Ductus epididymidis














**Věděli jste, že kdybyste
vyndali z člověka
všechny cévy a natáhli je
do roviny za sebe, šli
byste na hrozně dlouho
do vězení ?**

Varle a nadvarle

tepenné zásobení

- aorta abdominalis

→ **a. testicularis**

větve vstupují do lalůčků z
periferie (tunica vasculosa)

pomocné tepenné zásobení

- a. iliaca interna

→ a. umbilicalis


→ **a. ductus deferentis**


- a. iliaca externa

→ a. epigastrica inf.

→ **a. cremasterica**

vzájemné anastomózy






Varle a nadvarle

žilní, mízní a nervové zásobení


vše z/do úrovně L2


- Žíly:
 - rete testis → **plexus pampiniformis** → vv. testiculares → v. cava inf. (dx.) / v. renalis (sin.)
- Míza:
 - **nodi lymphoidei lumbales**
- Nervy:
 - plexus testicularis
 - *sympatikus* z plexus coeliacus + intermesentericus
 - *parasympatikus* z **n. vagus**



Protiproudový výměnný systém

Ochlazování arteriální krve pomocí
plexus pampiniformis
(vývoj spermií – 35 °C)





Šourek (*Scrotum*)

- popis: raphe, septum (úplné)
- stěna: deriváty břišní stěny + tunica dartos
- kůže: tenká pigmentovaná bez tukových buněk
- mazové a potní žlázy
- vrstva myofibroblastů v dermis → stahy
- tepny:
 - a. femoralis → aa. pudendae ext.
 - a. iliaca int. → a. pudenda int.
 - a. cremasterica pro obaly
- žíly:
 - vv. scrotales ant. → v. femoralis communis
 - vv. scrotales post. → v. pudenda int.

Šourek – *inervace a míza*



Nervy:


- přední 1/3 – n. ilioinguinalis + r. genitalis n. genitofemoralis
- posterior 2/3 – n. pudendus + n. cutaneus femoris post.

Míza: n.l. inguinales superficiales

nikdy neprovádět punkci varlete !!!

– nebezpečí **zavlečení nádorových buněk** do **jiné** tributární oblasti mízních uzlin !!!





Břišní stěna x Vrstvy šourku


- kůže
- Camperova vazivová vrstva

- fascia abd. subcutanea
Scarpae
- fascia abd. superficialis
- mm. abdominis
- fascia transversalis
- peritoneum


- kůže

- tunica dartos

- fascia spermatica ext.
- m. cremaster + fascia cremasterica
- fascia spermatica int.
- tunica vaginalis testis
 - lamina parietalis = periorchium
 - lamina visceralis = epiorchium



Understanding layers of the spermatic cord from Deep inguinal ring to the Scrotum



Harding JR. The case of the haunted scrotum. *J R Soc Med.* 1996;89(10):600.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1295986/>

The case of the haunted scrotum

A 45-year-old man was referred for investigation of an undescended right testis by computed tomography (CT). An ultrasound scan showed a normal testis and epididymis on the left side. The right testis was not visualized in the scrotal sac or in the right inguinal region. On CT scanning of the abdomen and pelvis, the right testis was not identified but the left side of the scrotum seemed to be occupied by a screaming ghost-like apparition (Figure 1). By chance, the distribution of normal anatomical structures within the left side of the scrotum had combined to produce this image. What of the undescended right testis? None was found. If you were a right testis, would you want to share the scrotum with that?

J R Harding

Consultant Radiologist, Royal Gwent Hospital, Newport, Gwent NP9 2UB, Wales



Figure 1 Detail from left side of scrotum

